

Operation for overskydende hud på mave

Operation for overskydende hud på maven kaldes også maveplastik eller abdominalplastik. Ved operationen fjernes overskydende hud på maven der ikke kan trænes væk. Den overskydende hud kan være tilkommet efter vægttab, graviditet eller med alderen. Ved operationen opstrammes huden og hvis der er behov, kan bugvægsmuskulaturen også opstrammes.

Forundersøgelse

Når du møder til forundersøgelse, er det vigtigt for os at forstå dine ønsker og overvejelser. Du vil blive spurgt til din generelle helbredstilstand, herunder tidligere og aktuel sygdom, medicin, allergier, og om du ryger. Derudover er information om tidligere kosmetiske behandlinger og/eller operationer, beskæftigelse og sport væsentlig. Vi vil herefter undersøge dig og der vil blive taget fotos til din journal.

Formålet med forundersøgelsen er ud fra dine ønsker og din generelle helbredstilstand at vurdere den bedste plan for dig. Vi vurderer og vejleder dig i hvilken type behandling og/eller operation der vil give dig det bedste resultat og sammen laver vi en behandlingsplan. Du vil herefter få information om forholdsregler før og efter operationen, hvordan bedøvelse og operation foretages og potentielle komplikationer.

Når du har været til forundersøgelse, er der lovmæssigt 7 dages betænkningstid, dvs. der skal gå minimum 7 dage fra konsultationen til du endeligt kan give dit samtykke og få foretaget operation. Du vil, når du møder til operation, blive bedt om at skrive under på, at du har modtaget mundtlig og skriftlig information, at du har forstået informationen og haft mulighed for at stille spørgsmål og have en bisidder med.

Forberedelse før operationen

Du kan optimere dit udbytte af operationen ved at dyrke motion og spise sundt op til operationen. Det er vigtigt at du er normalvægtig og har et godt helbred. De første dage efter operationen skal du tage det med ro og det er derfor en god ide at have forberedt sig hjemme og handlet ind.

Medicin

Af hensyn til blødningsrisikoen er det vigtigt, at du ikke benytter Acetylsalicylsyreholdige præparater, f.eks. Kodimagnyl, Børnemagnyl, Treo eller anden blodfortyndende medicin i 8 dage før ud for operationen. Ved lægeordineret blodfortyndende medicin bør pausen med den blodfortyndende medicin ske i samråd med egen læge.

Vær opmærksom på, at visse naturprodukter måske virker blodfortyndende. (f.eks.: Q10, fiskeolie, hvidløgskapsler, ingefærkapsler, E-vitamin og rødkløver). Afhængigt af hvad du tager, vil vi til forundersøgelsen vurdere, hvor længe vi anbefaler pause.

Rygning

Rygning kan være årsag til infektion, dårlig sårheling og vævsdød. Hvis du ryger, er det derfor vigtigt, at du stopper helt minimum 8 uger før og 4 uger efter operation.

BMI

Det optimale body mass index (BMI) inden operation for overskydende hud på maven er mellem 20 og 25. Dette dog med forbehold for kropsbygning. Du udregner dit BMI ved din vægt i kg/(højde i m x højde i m).

Operationsdagen

Du skal faste 6 timer før det planlagte tidspunkt for din operation. Det vil sige, hvis du skal opereres om morgenen skal du undlade morgenmad. Op til 2 timer før anbefaler vi at du drikker et glas vand eller saftvand. Herefter må du ikke indtage yderligere inden operationen. Du må ikke indtage mælkeprodukter på operationsdagen. Hvis du tager et lægemiddel mod svær overvægt (wegovy eller ozempic), skal du holde pause med medicinen og faste længere tid før operationen end vanligt. Hvor længe er individuelt og aftales med kirurgen ved forundersøgelsen.

Vi anbefaler at du undlader at have makeup, cremer og neglelak på. Desuden er det vigtigt at du ikke bærer smykker eller piercinger nogen steder på kroppen.

Når du kommer ind på operationsstuen, vil plastikkirurgen lave tusch-markeringer på huden og du vil få lagt et drop.

Bedøvelse og operation

En maveplastik foretages i fuld bedøvelse og operationen varer ca. 2 timer afhængigt af omfang.

Overordnet skelnes mellem 3 forskellige typer maveplastik. Fælles for dem alle er, at den overskydende hud fjernes, hvorefter huden syes sammen igen. Ved behov kan der kombineres med fedtsugning af maven og sammensyning af de lodrette mavemusklér i midtlinien. Hvorvidt dette skal gøres aftales ved forundersøgelsen. Du vil blive syet med selvopløselige tråde i flere lag. Afhængigt af forholdene under operationen kan du vågne op med dræn, der oftest fjernes dagen efter operation. Under operationen vil du få en engangsdosis antibiotika for at forebygge infektion.

Mini maveplastik

Ved en mini maveplastik er det udelukkende huden under navlen, der opstrammes. Ofte foretages denne type operation ved f.eks. korrektion af ar efter kejsersnit. Du får et vandret ar svarende til nedre del af maven. Længden på arret kan variere afhængigt af behov, men kan gå fra hofte til hofte. En mini maveplastik kan efter individuel vurdering eventuelt foretages i lokal bedøvelse.

Maveplastik

Ved en maveplastik løftes huden på maven og trækkes ned. Den overskydende hud fjernes og der tildannes et nyt hul til navlen. Ved denne operation får du ar rundt om navlen og vandret svarende til nedre del af maven fra hofte til hofte.

Udvidet maveplastik

En udvidet maveplastik kaldes også maveplastik med "fleur de lis", da huden der fjernes, har form som en fransk lilje. Ved denne operation får du et lodret ar der går ned i midtlinien over maven fra brystbenet og rundt om navlen og ned til et vandret ar svarende til nedre del af maven fra hofte til hofte.

Efter operationen

Efter operationen indlægges du til observation. Du skal overnatte på klinikken og udskrives morgenen efter operation, når du er kontrolleret, og alt er i orden. Der skal være én til at køre dig hjem og være hos dig det første døgn derefter. Ved mini maveplastik kan du dog som regel udskrives samme dag.

På selve arrene sætter vi micropore (englehud) plaster, der skal blive siddende til du kommer til kontrol efter 14 dage. Du vil blive syet med selvopløselig tråd, men der kan være små trådender der skal fjernes. Herover vil du få en absorberende hvid forbindelse der skal fjernes dagen efter operation. Yderst får du en longuette (et bredt mavebælte). Hvor længe du skal have mavebæltet på afhænger af omfanget af din operation, men ofte vil det være døgnnet rundt de første 8 uger efter operation og herefter yderligere 4 uger i dagtid.

Du må tage brusebad 3 dage efter operationen. Det micropore plaster, der er sat på arrene, skal blive på under badet, men skal tørres efter vask. Du kan eventuelt benytte en hårtørret til at tørre plastret, men vær opmærksom på at det ikke bliver for varmt, da det kan give forbrændinger af huden. Du skal undgå badekar, svømmebad, havvand og spa de første 4 uger efter operation.

Det er vigtigt at holde sig i ro de første dage efter operationen, så der ikke produceres mere væske, hævelse og spænding i det opererede område end højst nødvendigt. Men det er også vigtigt fra start at komme lidt op og gå indimellem så du forebygger blodpropper. Der vil være en vis træthed, som er normalt efter et kirurgisk indgreb. Derfor har du behov for at hvile mere end sædvanligt i ugerne efter indgrebet. Du skal tage det med ro frem til tråd fjernelsen. Herefter kan du stille og roligt øge aktivitetsniveauet, men vi anbefaler at du undgår belastende fysisk anstrengelse og sport de første 6-8 uger efter operation. Hvis du har fået syet mavemusklerne sammen, må du ikke lave tunge løft 6 måneder efter operationen. Hvor længe, du skal være sygemeldt, afhænger af din beskæftigelse, men vanligvis 2 uger. Har du et arbejde, hvor du bruger din krop meget, kan der være behov for længere varighed.

Der vil være nogen ømhed og smerter de første dage efter operationen. Langt de fleste er dog smertedækket på håndkøbs smertestillende og ophører med medicinen efter 2-5 dage. Hvis du har fået syet mavemusklerne sammen, vil du forventeligt have flere smerter. Plastikkirurgen laver en plan for dig for den smertestillende medicin. Du vil få medicin og skriftlig information om, hvordan du skal tage medicinen, med hjem fra klinikken til de første døgn.

Du får et telefonnummer med hjem således du kan få fat i os døgnet rundt så længe du er nyopereret. Herefter, ved ikke akutte forespørgsler, vil vi bede om at du i stedet kontakter klinikken i telefontiden eller på email.

3-6 måneder efter operationen ses du til en afsluttende kontrol hos operatøren.

Vedligeholdelse

Hvor godt man heler efter operation afhænger af både indre og ydre faktorer. Vi anbefaler at du benytter micropore plaster på arrene de første 3 måneder efter operation og skifter det hver 7.-10. dag. Derudover er det vigtigt at du undgår sol på arrene det første år efter operationen, undgår rygning og spiser sundt. Hvis du har vægtændringer efter operationen, kan det bidrage til fornyet overskydende hud. Derfor anbefaler vi at du inden operation har den vægt du også ønsker at have efter operation.

Forventelige forhold og potentielle komplikationer

Efter indgrebet kan der være hævelse og misfarvning af huden. I starten vil misfarvningerne være blå/lilla og efterhånden bliver de mere gule/grønne og sænker sig, hvorefter de forsvinder i løbet af 2-3 uger. Du vil dog fortsat være hævet og det endelige resultat ses tidligst efter 6-8 uger. I sjældne tilfælde kan helingsperioden strække sig over måneder. Når man strammer ud i huden, er det forventeligt at der kan komme et lille tilbagefald af løshed afhængigt af hudens kvalitet.

De fleste oplever den første tid efter operationen nedsat følesans svarende til arrene og operationsområdet. Det normaliserer sig som regel i løbet af de første 3 måneder når huden og følenerverne heler, men hos nogle kan der gå op til et år. Meget sjældent kommer følesansen ikke igen. Derudover kan der være føleforstyrrelser f.eks. i form af kløe i arrene i op til 6 måneder efter operationen.

I tiden umiddelbart efter operationen vil arrene være røde, men farven aftager over en længere periode. Hos de fleste heler arrene flot ind, men der kan være forskel på hvordan man heler og der kan tilkomme

skæmmende ardannelse. Det kan hos få patienter være nødvendigt at lave en mindre korrektion af arrene. En sådan korrektion vil tidligst blive lavet 6 måneder efter den primære operation.

Komplikationer

Der forekommer sjældent alvorlige komplikationer (< 1%) i forbindelse med maveplastik.

Ekstremt sjældent kan der tilkomme en blødning der vil kræve en ny operation. Blødning viser sig som regel som en pludselig ansamling, misfarvning af huden og smerter. Blødning forekommer oftest i løbet af det første døgn efter operation. Skulle der alligevel opstå tegn til blødning efter du er udskrevet, er det vigtigt at du kontakter os på det akut telefonnummer, du har fået udleveret. Derudover kan der i ugerne efter operation hos op til 5% forekomme væskeansamling under huden, der ville skulle tømmes ud med en kanyler.

Meget sjældent kan der tilkomme infektion, der ville skulle behandles med antibiotika. Infektion viser sig ved rødme, varme, hævelse og ømhed af operationsområdet og eventuelt feber. Da huden løftes fra den underliggende muskulatur og blodforsyning, kan meget sjældent ses vævsdød i en del af eller hele området. Dette kan føre til sårannelser der ville skulle hele op og sårpleje i en længere periode. Herudover kan det forekomme at arrene går op og der tilkommer ophelings problemer.

Indimellem kan de selvopløselige tråde du bliver syet med i underhuden afstødes. Det vil vise sig som små sårannelser i arrene og når trådene fjernes heler det. Det kan ligne infektion men kræver normalt ikke behandling med antibiotika. Er du i tvivl skal du kontakte klinikken.

Med venlig hilsen

Plastikkirurgisk og Kosmetisk klinik Lindehaven

Lindevej 65

5250 Odense SV

Tlf. 66136214

reception@lindehaven-plastikkirurgi.dk

<https://lindehaven-plastikkirurgi.dk/>